

Il paziente deve essere a digiuno dalla mezzanotte e la sera precedente deve fare un pasto leggero (solo minestrina) entro le ore 20:00. Dopo tale orario si possono assumere solo piccole quantità di acqua fino alle ore 24:00.

Il paziente deve essere accompagnato, poiché la sedazione controindica la guida.

Esibire documentazione clinica ed elenco dettagliato dei farmaci con relativo dosaggio, eventuali esami precedenti, tessera sanitaria e certificazione esenzioni.

ANTICOAGULANTI ORALI: I pazienti che assumono farmaci anticoagulanti (Coumadin, Sintrom) dovranno sospendere la terapia 5 giorni prima della gastroscopia al fine di ottenere un valore di PT-INR minore di 1.5. In accordo con il medico curante/specialista il paziente può assumere enoxaparina pari a 4.000U/die.

NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI: i pazienti che assumono farmaci anticoagulanti, (Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban), dovranno sospendere la terapia 2 giorni prima dell'esame.

FARMACI ANTIAGGREGANTI: I pazienti che assumono farmaci anti-aggreganti acido acetilsalicilico, indobufene, trifusal (Cardioaspirina, Ibustrin, Plavix, Ticlopidina, Triflux, Cardirene), potranno continuare ad assumere questi farmaci sino al giorno prima dell'esame.

DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE: (acido acetilsalicilico+ticlopidina o clopidogrel o prasugrel o ticagrelor): i pazienti che assumono doppia terapia antiaggregante, previo accordo con il medico curante/specialista, dovranno sospendere il secondo farmaco antiaggregante 5 giorni prima proseguendo con la sola terapia con acido acetilsalicilico fino al giorno prima dell'esame.

Dopo la procedura proseguire la terapia con il solo acido acetilsalicilico per 5 giorni.

AGGIORNATO AL 04.10.2022

Il Responsabile
Dr. Amedeo Indriolo

Verificato e confermato in data _____ Firma _____